

MORTALIDAD POR

C. ISQUÉMICA Y E. CEREBROVASCULARES CANARIAS/ESPAÑA (1980-2017)

GIL MUÑOZ M, DOMÍNGUEZ LÁZARO A, LORENZO RUANO P
Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública

Antecedentes/Objetivos

Las Enfermedades cardiovasculares representan actualmente la principal causa de muerte en el mundo. La mayor parte de ellas se asocian a factores de riesgo modificables y prevenibles.

- **Objetivo:** Analizar las diferencias en la mortalidad por **C. isquémica (CI)** y **E. Cerebrovasculares (ECV)** entre **Canarias** y **España** (1980-2017).

Métodos

- Códigos CIE > **CI:** 410-414 (CIE.9) y I20-I24 (CIE.10); **ECV:** 430-438 (CIE.9) e I60-I64 (CIE.10).
- Se calcularon las tasas brutas, ajustadas (Ts) y específicas por sexos y grupos de edad seleccionados; y las razones de tasas entre Canarias y España. El ajuste de las tasas se hizo por el método directo (población estándar europea, 2013).
- Las tendencias se analizaron mediante un modelo de regresión de joinpoint, que identifica el momento en que se producen cambios significativos ($p < 0,05$) y su magnitud (PCA: % cambio anual).
- Se calcularon los APVP (límites de edad: 1 y 75 años).

Resultados

Defunciones

2017

- **CI:** Ambos sexos > 1ª causa en **ambos territorios** (excepción: Mujeres españolas -2ª-).
Canarias: 1.451(61% hombres). **España:** 32.325 (59% hombres).
- **ECV:** Mujeres > 2ª causa en **Canarias** y 1ª en España; Hombres > 3ª en **ambos territorios**.
Canarias: 791(54% mujeres). **España:** 26.937 (57% mujeres).

| CARDIOPATIA ISQUÉMICA (2017) | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| Edad | Canarias | | | España | | | Dif. % |
| | Def | % | Dif. % | Def | % | Dif. % | |
| 35-44 | 21 | 1,4 | 0,0 | 332 | 1,0 | -48,0 | |
| 45-54 | 70 | 4,8 | -35,2 | 1.281 | 4,0 | -38,7 | |
| 55-64 | 180 | 12,4 | 6,5 | 2.802 | 8,7 | -34,5 | |
| 65-74 | 291 | 20,1 | -4,0 | 4.791 | 14,8 | -40,8 | |
| 75-84 | 419 | 28,9 | 43,5 | 8.915 | 27,6 | 1,3 | |
| 85 y + | 465 | 32,0 | 257,7 | 14.165 | 43,8 | 272,9 | |
| Total | 1.451 | 100,0 | 40,7 | 32.325 | 100,0 | 15,6 | |

| HOMBRES | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------|
| Edad | Canarias | | | España | | | Dif. % |
| | Def | % | Dif. % | Def | % | Dif. % | |
| 35-44 | 14 | 1,6 | -22,2 | 282 | 1,5 | -48,3 | |
| 45-54 | 60 | 6,7 | -32,6 | 1.064 | 5,6 | -41,2 | |
| 55-64 | 140 | 15,7 | 21,7 | 2.336 | 12,2 | -31,4 | |
| 65-74 | 213 | 23,9 | 19,0 | 3.656 | 19,1 | -31,4 | |
| 75-84 | 254 | 28,5 | 78,9 | 5.549 | 29,0 | 26,1 | |
| 85 y + | 205 | 23,0 | 345,7 | 6.211 | 32,5 | 370,5 | |
| Total | 891 | 100,0 | 49,2 | 19.132 | 100,0 | 12,4 | |

| Mujeres | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------|
| Edad | Canarias | | | España | | | Dif. % |
| | Def | % | Dif. % | Def | % | Dif. % | |
| 35-44 | 7 | 1,3 | 133,3 | 50 | 0,4 | -46,2 | |
| 45-54 | 10 | 1,8 | -47,4 | 217 | 1,6 | -22,8 | |
| 55-64 | 40 | 7,1 | -25,9 | 466 | 3,5 | -46,7 | |
| 65-74 | 78 | 13,9 | -37,1 | 1.135 | 8,6 | -59,0 | |
| 75-84 | 165 | 29,5 | 10,0 | 3.366 | 25,5 | -23,5 | |
| 85 y + | 260 | 46,4 | 209,5 | 7.954 | 60,3 | 220,9 | |
| Total | 560 | 100,0 | 29,0 | 13.193 | 100,0 | 20,6 | |

%. Porcentaje de cada grupo de edad respecto al total.
 Dif. %: Variación porcentual 2017/1980.
 Fuente: INE.

Aumentan con la edad.

En los dos últimos grupos de edad:

- **CI:** 61% (Can) y 71% (Esp)
- **ECV:** 74 % (Can) y 83% (Esp).

Comparación con 1980

- **CI:** ▲ 41% (Can); 16% (Esp).
- **ECV:** ▼ 37% (Can); 43% (Esp).

En **ambos territorios** aumenta la importancia del 85+ en la **CI** y desciende la del 65-74 en las **ECV**.

| E. CEREBROVASCULARES (2017) | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | |
| Edad | Canarias | | | España | | | Dif. % |
| | Def | % | Dif. % | Def | % | Dif. % | |
| 35-44 | 8 | 1,0 | -52,9 | 153 | 0,6 | -59,8 | |
| 45-54 | 25 | 3,2 | -45,7 | 578 | 2,1 | -55,6 | |
| 55-64 | 67 | 8,5 | -40,7 | 1.167 | 4,3 | -66,3 | |
| 65-74 | 103 | 13,0 | -67,7 | 2.694 | 10,0 | -75,7 | |
| 75-84 | 277 | 35,0 | -40,7 | 7.851 | 29,1 | -61,3 | |
| 85 y + | 308 | 38,9 | 13,2 | 14.434 | 53,6 | 38,0 | |
| Total | 791 | 100,0 | -37,0 | 26.937 | 100,0 | -43,3 | |

| HOMBRES | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| Edad | Canarias | | | España | | | Dif. % |
| | Def | % | Dif. % | Def | % | Dif. % | |
| 35-44 | 4 | 1,1 | -63,6 | 88 | 0,8 | -63,2 | |
| 45-54 | 19 | 5,2 | -29,6 | 371 | 3,2 | -54,1 | |
| 55-64 | 41 | 11,3 | -37,9 | 780 | 6,8 | -60,7 | |
| 65-74 | 63 | 17,4 | -63,8 | 1.690 | 14,6 | -69,7 | |
| 75-84 | 140 | 38,7 | -30,0 | 3.815 | 33,0 | -53,1 | |
| 85 y + | 94 | 26,0 | 10,6 | 4.786 | 41,4 | 46,8 | |
| Total | 362 | 100,0 | -37,4 | 11.555 | 100,0 | -43,1 | |

| MUJERES | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| Edad | Canarias | | | España | | | Dif. % |
| | Def | % | Dif. % | Def | % | Dif. % | |
| 35-44 | 4 | 0,9 | -33,3 | 65 | 0,4 | -54,2 | |
| 45-54 | 6 | 1,4 | -68,4 | 207 | 1,3 | -58,0 | |
| 55-64 | 26 | 6,1 | -44,7 | 387 | 2,5 | -73,8 | |
| 65-74 | 40 | 9,3 | -72,4 | 1.004 | 6,5 | -81,7 | |
| 75-84 | 137 | 31,9 | -48,7 | 4.036 | 26,2 | -66,8 | |
| 85 y + | 214 | 49,9 | 14,4 | 9.648 | 62,7 | 34,0 | |
| Total | 429 | 100,0 | -36,6 | 15.382 | 100,0 | -43,4 | |

%. Porcentaje de cada grupo de edad respecto al total.
 Dif. %: Variación porcentual 2017/1980.
 Fuente: INE.

Tasas de mortalidad

2017

El riesgo de morir en **Canarias** es:

- **CI**: > Ambos sexos (hombres:10% ;mujeres:60%).
- **ECV**: < en hombres (20%) y > en mujeres (10%).

Por grupos de edad:

| CARDIOPATÍA ISQUÉMICA | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|--------|-------|-----|
| HOMBRES | | | | | |
| | Canarias | | España | | Rts |
| | Tb | Ts | Tb | Ts | |
| 1980 | 88,5 | 243,3 | 92,5 | 193,5 | 1,3 |
| 2017 | 82,6 | 103,9 | 83,8 | 93,6 | 1,1 |

| MUJERES | | | | | |
|---------|----------|-------|--------|------|-----|
| | Canarias | | España | | Rts |
| | Tb | Ts | Tb | Ts | |
| 1980 | 64,0 | 152,9 | 57,3 | 99,8 | 1,5 |
| 2017 | 51,4 | 54,0 | 54,5 | 33,4 | 1,6 |

| E. CEREBROVASCULARES | | | | | |
|----------------------|----------|-------|--------|-------|-----|
| HOMBRES | | | | | |
| | Canarias | | España | | Rts |
| | Tb | Ts | Tb | Ts | |
| 1980 | 85,7 | 288,8 | 110,4 | 291,7 | 1,0 |
| 2017 | 33,6 | 43,8 | 50,6 | 57,4 | 0,8 |

| MUJERES | | | | | |
|---------|----------|-------|--------|-------|-----|
| | Canarias | | España | | Rts |
| | Tb | Ts | Tb | Ts | |
| 1980 | 99,8 | 259,5 | 142,3 | 257,4 | 1,0 |
| 2017 | 39,4 | 41,6 | 63,6 | 38,0 | 1,1 |

Tb: Tasa bruta; Ts: Tasa ajustada. Tasas por 100 mil
Rts: Razones de tasas ajustadas Canarias/España.
Fuente: INE. Laboración propia.

| CARDIOPATÍA ISQUÉMICA | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|---------|----------|--------|-----|
| HOMBRES | | | MUJERES | | | |
| | Canarias | España | Rts | Canarias | España | Rts |
| 35-44 años | | | | | | |
| 1980 | 23.4 | 25.5 | 0,9 | 3,9 | 4,3 | 0,9 |
| 2017 | 7.3 | 7.3 | 1,0 | 3,8 | 2,2 | 2,8 |
| 45-54 años | | | | | | |
| 1980 | 127.8 | 79.7 | 1,6 | 26,5 | 12,0 | 2,2 |
| 2017 | 31.5 | 29.0 | 1,1 | 5,4 | 6,0 | 0,9 |
| 55-64 años | | | | | | |
| 1980 | 257.2 | 203.4 | 1,3 | 106.8 | 46.1 | 2,3 |
| 2017 | 105.3 | 81.6 | 1,3 | 29.6 | 15.6 | 1,9 |
| 65-74 años | | | | | | |
| 1980 | 541.9 | 468.8 | 1,2 | 313.9 | 183.8 | 1,7 |
| 2017 | 234.1 | 173.8 | 1,3 | 79.8 | 47.8 | 1,7 |
| 75-84 años | | | | | | |
| 1980 | 1194.3 | 902.7 | 1,3 | 804.3 | 553.8 | 1,5 |
| 2017 | 520.2 | 442.1 | 1,2 | 262.7 | 196.6 | 1,3 |
| 85 y más años | | | | | | |
| 1980 | 2000.5 | 1666.2 | 1,2 | 1928.9 | 1410.6 | 1,4 |
| 2017 | 1074.3 | 1287.3 | 0,8 | 978.5 | 548.8 | 1,8 |

Tasas por 100 mil.
Rts: Razones de tasas Canarias/España.
Fuente: INE. Elaboración propia.

- **CI**: > Ambos sexos (excepciones: hombres de 85+ y mujeres de 45-54).
- **ECV**: Comportamiento menos uniforme > Mujeres de 55-64 (50%) < Mujeres 45-54 (60%) y hombres 85+ (50%)

Comparación 1980

El riesgo de morir por **CI** y **ECV** ▼ en hombres y en mujeres (ambos territorios).


| E. CEREBROVASCULARES | | | | | | |
|----------------------|----------|--------|---------|----------|--------|-----|
| HOMBRES | | | MUJERES | | | |
| | Canarias | España | Rts | Canarias | España | Rts |
| 35-44 años | | | | | | |
| 1980 | 14.3 | 11.2 | 1,3 | 7.8 | 6.6 | 1,2 |
| 2017 | 2.1 | 2.3 | 0,9 | 1.3 | 1.8 | 1,2 |
| 45-54 años | | | | | | |
| 1980 | 38.8 | 35.7 | 1,1 | 26.5 | 21,1 | 1,3 |
| 2017 | 10.0 | 10.1 | 1,0 | 3.3 | 5.7 | 0,6 |
| 55-64 años | | | | | | |
| 1980 | 147.6 | 118.6 | 1,2 | 93.0 | 77.8 | 1,2 |
| 2017 | 30.8 | 27.2 | 1,1 | 19.3 | 12.9 | 1,5 |
| 65-74 años | | | | | | |
| 1980 | 526.8 | 491.4 | 1,1 | 367.1 | 364.6 | 1,0 |
| 2017 | 69.3 | 80.3 | 0,9 | 40.9 | 42.3 | 1,0 |
| 75-84 años | | | | | | |
| 1980 | 1682.1 | 1669.9 | 1,0 | 1431.7 | 1531.6 | 0,9 |
| 2017 | 286.7 | 304.0 | 0,9 | 218.1 | 235.7 | 0,9 |
| 85 y más años | | | | | | |
| 1980 | 3696.6 | 4115.1 | 0,9 | 4294.1 | 4096.8 | 1,0 |
| 2017 | 492.6 | 991.9 | 0,5 | 805.4 | 665.6 | 1,2 |

Tasas por 100 mil.
Rts: Razones de tasas Canarias/España.
Fuente: INE. Elaboración propia.


Tendencias

Ambos territorios y sexos: Tendencia decreciente, significativa y no homogénea en el Total de edades y en los grupos de edad seleccionados (excepción: CI en 85+ -ligeramente estable-).


Hombres




Mujeres



Hombres



Mujeres



Λ= Significación estadística.
Fuente: INE. Elaboración propia.

Λ= Significación estadística.
Fuente: INE. Elaboración propia.

Cardiopatía Isquémica

| HOMBRES | | | | | | | | | | MÚJERES | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| TODAS LAS EDADES | | | | | | | | | | TODAS LAS EDADES | | | | | | | | | |
| Tasa 1980 | TOTAL | PCA | Periodo 1 | PCA 1 | Periodo 2 | PCA 2 | Periodo 3 | PCA 3 | Tasa 1980 | TOTAL | PCA | Periodo 1 | PCA 1 | Periodo 2 | PCA 2 | Periodo 3 | PCA 3 | | |
| Canarias | 243.3 | 1980-2017 | -2.5*(3.6;-2.0) | 1980-2003 | 0.5*(0.5;-0.0) | 2003-2012 | -7.8*(9.5;-5.7) | 2012-2017 | -0.7*(5.2;4.0) | 288.8 | 1980-2017 | -5.3*(5.5;-5.0) | 1980-2003 | -4.7*(5.1;-4.3) | 2003-2013 | -7.4*(8.0;-5.5) | 2013-2017 | 1.5*(4.2;7.5) | |
| España | 193.5 | 1980-2017 | -2.8*(2.3;-1.7) | 1980-2000 | 0.5*(0.7;-0.4) | 2000-2017 | -3.8*(4.0;-3.6) | | 291.7 | 1980-2017 | -4.4*(4.6;-4.3) | 1980-2005 | -4.1*(4.2;-4.0) | 2005-2013 | -6.0*(6.5;-5.1) | 2013-2017 | -2.7*(4.9;-0.9) | | |
| 35-44 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canarias | 23.4 | 1980-2017 | -3.1*(3.5;-2.4) | 1980-1998 | -0.5*(2.4;1.5) | 1998-2017 | -5.5*(7.2;-3.8) | | 14.3 | 1980-2017 | 6.3*(7.2;-5.3) | 1980-1988 | 1.5*(0.1;1.8) | 1988-2017 | -7.3*(8.6;-6.0) | | | | |
| España | 25.5 | 1980-2017 | -3.8*(4.0;-3.2) | 1980-2000 | -1.8*(2.3;-1.3) | 2000-2015 | 6.0*(6.9;-5.2) | 2015-2017 | 4.1*(-13.3;25.0) | 11.2 | 1980-2017 | 4.4*(4.8;-4.0) | 1980-2003 | -3.3*(3.9;-2.8) | 2003-2017 | 6.6*(7.8;-5.4) | | | |
| 45-54 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canarias | 127.9 | 1980-2017 | -2.8*(3.1;-2.1) | 1980-2005 | -1.3*(1.5;-0.6) | 2005-2017 | -5.3*(8.2;-4.4) | | 39.8 | 1980-2017 | 4.9*(5.4;-4.3) | 1980-2008 | -4.2*(5.1;-4.1) | 2008-2011 | -10.7*(12.2;9.0) | 2011-2017 | 5.2*(3.6;6.9) | | |
| España | 79.7 | 1980-2017 | -2.6*(2.8;-2.4) | 1980-2001 | -1.8*(2.0;-1.5) | 2001-2017 | -3.8*(4.2;-3.4) | | 35.7 | 1980-2017 | -3.7*(3.8;-3.5) | 1980-2008 | -3.8*(3.7;-3.4) | 2008-2011 | -7.4*(-16.8;1.3) | 2011-2017 | -0.8*(2.6;1.1) | | |
| 55-64 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canarias | 257.2 | 1980-2017 | -2.9*(3.3;-2.5) | 1980-2002 | -1.2*(1.7;-0.7) | 2002-2010 | -7.8*(10.5;-5.0) | 2010-2017 | 0.2*(2.7;3.2) | 147.6 | 1980-2017 | -4.7*(5.1;-4.2) | | | | | | | |
| España | 203.4 | 1980-2017 | -2.8*(3.0;-2.6) | 1980-1998 | -1.7*(1.8;-1.4) | 1998-2011 | -4.2*(4.7;-3.8) | 2011-2017 | -1.2*(2.5;0.1) | 118.6 | 1980-2017 | -4.1*(4.2;-4.0) | | | | | | | |
| 65-74 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canarias | 541.9 | 1980-2017 | -3.4*(3.9;-2.9) | 1980-2000 | -0.9*(1.6;-0.2) | 2000-2013 | -7.3*(8.7;-5.9) | 2013-2017 | 2.7*(5.2;11.3) | 526.8 | 1980-2017 | -5.5*(5.9;-5.1) | 1980-2004 | -5.1*(5.9;-4.3) | 2004-2013 | -8.3*(12.2;-4.3) | 2013-2017 | 6.0*(4.4;7.6) | |
| España | 468.8 | 1980-2017 | -2.9*(3.2;-2.6) | 1980-1999 | -1.1*(1.3;-0.9) | 1999-2013 | -5.1*(5.5;-4.8) | 2013-2017 | -1.7*(3.9;0.6) | 491.4 | 1980-2017 | -4.8*(5.0;-4.7) | 1980-1990 | -6.3*(7.3;-5.2) | 1990-2004 | -3.8*(4.6;-3.1) | 2004-2017 | -5.7*(6.4;-5.0) | |
| 75-84 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canarias | 1194.3 | 1980-2017 | -2.6*(3.1;-2.0) | 1980-2001 | 0.1*(0.6;0.0) | 2001-2012 | -7.3*(9.3;-5.3) | 2012-2017 | -0.2*(2.6;2.6) | 1652.1 | 1980-2017 | -5.3*(5.6;-4.9) | 1980-2002 | -4.7*(5.3;-4.1) | 2002-2012 | -7.9*(10.1;-5.3) | 2012-2017 | 3.8*(2.2;5.4) | |
| España | 902.7 | 1980-2017 | -3.8*(4.3;-3.1) | 1980-1999 | 0.1*(0.1;0.3) | 1999-2017 | -4.1*(4.3;-3.9) | | | 1059.9 | 1980-2017 | -4.7*(4.8;-4.6) | 1980-1984 | -2.7*(5.0;-0.1) | 1984-2017 | 4.8*(4.9;-4.7) | | | |
| 85+ AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canarias | 2000.5 | 1980-2017 | -1.4*(2.0;-0.8) | 1980-2003 | 0.8*(0.1;1.7) | 2003-2017 | -5.8*(7.5;-4.1) | | | 3696.6 | 1980-2017 | -5.2*(5.6;-4.9) | 1980-2003 | -4.9*(5.1;-3.9) | 2003-2017 | -6.8*(8.1;-5.6) | | | |
| España | 1666.2 | 1980-2017 | -0.6*(0.9;-0.3) | 1980-1988 | -0.2*(1.1;0.7) | 1988-2003 | 0.9*(0.5;1.3) | 2003-2017 | -3.2*(3.6;-2.8) | 4115.1 | 1980-2017 | -3.9*(4.1;-3.7) | 1980-1991 | -2.5*(3.1;-2.0) | 1991-2003 | -3.8*(4.4;-3.2) | 2003-2017 | -5.0*(5.6;-4.4) | |

E. Cerebrovasculares

| HOMBRES | | | | | | | | | | MÚJERES | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|--|
| TODAS LAS EDADES | | | | | | | | | | TODAS LAS EDADES | | | | | | | | | |
| Tasa 1980 | TOTAL | PCA | Periodo 1 | PCA 1 | Periodo 2 | PCA 2 | Periodo 3 | PCA 3 | Tasa 1980 | TOTAL | PCA | Periodo 1 | PCA 1 | Periodo 2 | PCA 2 | Periodo 3 | PCA 3 | | |
| Canarias | 152.9 | 1980-2017 | -2.7*(3.2;-2.1) | 1980-2003 | -0.5*(0.9;0.0) | 2003-2013 | -7.9*(8.7;-6.1) | 2013-2017 | -0.3*(3.7;3.5) | 209.5 | 1980-2017 | -5.3*(5.5;-5.0) | 1980-2005 | 4.9*(5.2;-4.6) | 2005-2011 | 0.3*(12.7;5.8) | 2011-2017 | 0.9*(2.0;3.9) | |
| España | 99.8 | 1980-2017 | -2.5*(2.8;-2.1) | 1980-1999 | -0.6*(1.0;-0.2) | 1999-2015 | -4.3*(4.9;-3.8) | 2015-2017 | -12.9*(24.1;0.1) | 257.4 | 1980-2017 | -4.8*(4.8;-4.8) | 1980-2003 | -4.3*(4.5;-4.1) | 2003-2017 | -5.8*(6.3;-5.4) | | | |
| 35-44 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canarias | 3.9 | 1980-2017 | -2.0*(3.1;-0.9) | | | | | | 7.8 | 1980-2017 | -2.5*(4.9;-0.1) | | | | | | | | |
| España | 4.3 | 1980-2017 | -2.3*(2.8;-1.9) | 1980-1984 | -10.5*(19.2;-0.9) | 1984-2002 | -0.4*(1.0;0.7) | 2002-2017 | -4.8*(5.8;-3.2) | 6.6 | 1980-2017 | -3.4*(3.8;-3.1) | 1980-2006 | -2.7*(3.3;-2.2) | 2006-2017 | -5.8*(7.6;-3.9) | | | |
| 45-54 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canarias | 26.5 | 1980-2017 | -2.3*(3.1;-1.5) | | | | | | 26.5 | 1980-2017 | -4.1*(4.9;-3.3) | | | | | | | | |
| España | 12.0 | 1980-2017 | -2.1*(2.3;-1.9) | | | | | | 21.1 | 1980-2017 | -3.6*(3.8;-3.3) | 1980-1997 | -4.8*(5.4;-4.3) | 1997-2007 | -1.5*(3.0;0.1) | 2007-2017 | -4.6*(5.9;-3.3) | | |
| 55-64 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canarias | 106.8 | 1980-2017 | -3.8*(4.4;-3.2) | 1980-1995 | -1.4*(3.5;0.6) | 1995-2017 | -5.2*(6.3;-4.0) | | 99.0 | 1980-2017 | 4.9*(5.7;-4.1) | 1980-2012 | 5.6*(6.5;-4.8) | 2012-2017 | 8.8*(6.2;6.3) | | | | |
| España | 65.1 | 1980-2017 | -3.4*(3.6;-3.1) | 1980-1997 | -2.0*(2.3;-1.6) | 1997-2009 | -3.6*(6.0;-4.7) | 2009-2017 | -1.5*(2.5;0.4) | 172.9 | 1980-2017 | -4.8*(5.1;-4.6) | 1980-1991 | -7.1*(7.9;-6.1) | 1991-2012 | -4.5*(4.8;-4.1) | 2012-2017 | -0.6*(3.2;3.2) | |
| 65-74 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canarias | 313.9 | 1980-2017 | -4.1*(4.7;-3.5) | 1980-2005 | 2.2*(2.8;-1.7) | 2005-2013 | -12.4*(15.6;-9.0) | 2013-2017 | 8.7*(7.1;10.3) | 387.1 | 1980-2017 | 6.2*(6.6;-6.0) | 1980-2012 | 6.5*(7.8;-6.1) | 2012-2017 | 0.1*(7.8;7.5) | | | |
| España | 183.8 | 1980-2017 | -4.0*(4.3;-3.6) | 1980-2000 | -1.9*(2.2;-1.7) | 2000-2014 | 6.8*(7.3;-6.3) | 2014-2017 | -1.2*(5.9;3.7) | 384.6 | 1980-2017 | -5.8*(6.0;-5.7) | 1980-1997 | 6.6*(7.8;-6.2) | 1997-2001 | -3.4*(9.0;2.6) | 2001-2017 | 5.9*(6.3;5.5) | |
| 75-84 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canarias | 804.3 | 1980-2017 | -3.1*(3.7;-2.5) | 1980-2001 | -0.1*(0.8;0.6) | 2001-2012 | -8.6*(10.4;-6.7) | 2012-2017 | -0.1*(5.7;5.9) | 1431.7 | 1980-2017 | -5.6*(5.9;-5.3) | 1980-2001 | -5.1*(5.6;-4.5) | 2001-2012 | -7.9*(9.5;-6.4) | 2012-2017 | 2.9*(1.9;3.8) | |
| España | 553.8 | 1980-2017 | -2.8*(3.2;-2.4) | 1980-1997 | -0.3*(0.6;0.1) | 1997-2003 | 3.6*(5.0;2.1) | 2003-2017 | -5.6*(5.9;-5.3) | 1531.6 | 1980-2017 | -5.3*(5.6;-5.2) | 1980-1991 | 4.2*(4.7;-3.6) | 1991-2013 | 5.7*(5.9;-5.5) | 2013-2017 | -3.0*(5.5;-0.5) | |
| 85+ AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canarias | 1928.9 | 1980-2017 | -1.4*(2.0;-0.8) | 1980-1991 | -1.7*(3.4;0.0) | 1991-2001 | 3.7*(2.6;4.7) | 2001-2017 | -5.8*(6.8;-4.9) | 4294.1 | 1980-2017 | -4.8*(5.1;-4.5) | 1980-2005 | -4.2*(4.7;-3.8) | 2005-2010 | -10.8*(16.5;-5.0) | 2010-2017 | -0.8*(3.7;2.6) | |
| España | 1410.6 | 1980-2017 | -1.4*(1.9;-0.9) | 1980-2007 | -0.3*(0.9;0.3) | 2007-2017 | -8.4*(8.9;-3.8) | | 4095.8 | 1980-2017 | -4.1*(4.4;-3.8) | 1980-2001 | -3.0*(3.3;-2.8) | 2001-2015 | -5.2*(5.6;-4.7) | 2015-2017 | -18.9*(25.9;-11.3) | | |

Mortalidad prematura

2017

| APVP CARDIOPATÍA ISQUÉMICA HOMBRES | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|------|------|---------|-----|------|------|--|
| | CANARIAS | | | | ESPAÑA | | | | |
| | APVP | Tb | Ts | Ā | APVP | Tb | Ts | Ā | |
| 1980 | 5.721 | 8,8 | 15,0 | 14,0 | 148.674 | 8,5 | 11,7 | 13,2 | |
| 2017 | 5.223 | 5,2 | 5,3 | 12,1 | 89.056 | 4,3 | 4,2 | 12,1 | |

| MUJERES | | | | | | | | | |
|---------|----------|-----|-----|------|--------|-----|-----|------|--|
| | CANARIAS | | | | ESPAÑA | | | | |
| | APVP | Tb | Ts | Ā | APVP | Tb | Ts | Ā | |
| 1980 | 1.878 | 2,9 | 5,0 | 9,4 | 36.811 | 2 | 2,7 | 9,1 | |
| 2017 | 1.420 | 1,4 | 1,4 | 10,5 | 19.125 | 0,9 | 0,9 | 10,2 | |

Tb: Tasa bruta; Ts: Tasa ajustada. Tasas por 1000.
Ā: Media de años de vida perdidos
Fuente: INE. Elaboración propia.

- ▼ APVP y riesgo de morir prematuramente que en 1980. Los hombres son los que más años pierden (también en 1980)

- En general, la Ā de años de vida perdidos por ambas causas es superior en **Canarias**.

| APVP E. CEREBROVASCULARES HOMBRES | | | | | | | | | |
|---|----------|-----|-----|------|--------|-----|-----|------|--|
| | CANARIAS | | | | ESPAÑA | | | | |
| | APVP | Tb | Ts | Ā | APVP | Tb | Ts | Ā | |
| 1980 | 3.646 | 5,6 | 9,1 | 12,4 | 93.438 | 5,3 | 7,4 | 10,5 | |
| 2017 | 1.537 | 1,5 | 1,5 | 12,0 | 31.853 | 1,5 | 1,5 | 10,8 | |

| MUJERES | | | | | | | | | |
|---------|----------|-----|-----|------|--------|-----|-----|------|--|
| | CANARIAS | | | | ESPAÑA | | | | |
| | APVP | Tb | Ts | Ā | APVP | Tb | Ts | Ā | |
| 1980 | 2.286 | 3,6 | 5,5 | 10,3 | 70.423 | 4,0 | 4,9 | 9,1 | |
| 2017 | 913 | 0,9 | 0,9 | 11,7 | 18.942 | 0,9 | 0,9 | 11,2 | |

Tb: Tasa bruta; Ts: Tasa ajustada. Tasas por 1000.
Ā: Media de años de vida perdidos
Fuente: INE. Elaboración propia.

Comparación con 1980: - Hombres: ▼ en **CI** y **ECV** (excepto **España**).
- Mujeres: ▲ en **CI** y **ECV**.

Conclusiones/Recomendaciones

- En Canarias, la mortalidad por CI es superior; por ECV es inferior en los hombres y algo superior en las mujeres. Las tendencias son decrecientes en ambas causas y, en general, más intensa en Canarias.
- Continuar con el fomento de hábitos saludables y la prevención de factores de riesgo.